

## Préconisations et renseignements cliniques Spermoculture

**Intérêt :**

Ce prélèvement permet le diagnostic des infections bactériennes du sperme. Il est effectué de préférence au laboratoire.

**Préconisations pour le prélèvement :**

Le prélèvement doit être effectué à distance de tout traitement antibiotique (sauf avis contraire du médecin prescripteur). Ne pas utiliser de préservatif.

- 1) Uriner dans les toilettes
- 2) Lavage soigneux des mains au savon.
- 3) Lavage du gland et de l'orifice urinaire avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire.
- 4) Recueillir la totalité de l'éjaculat obtenu par masturbation dans le flacon stérile mis à disposition par le laboratoire
- 5) Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- 6) Noter la date et l'heure du recueil sur la présente fiche.

Si le flacon doit être acheminé au laboratoire, il doit être maintenu à 37°C pendant le trajet et apporté dans un délai inférieur à 30 minutes.

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

*Etiquette patient***Conditions de recueil :**

Date du recueil :

Heure de recueil :

Date de remise au laboratoire :

Heure de remise au Laboratoire :

**Symptômes cliniques et problèmes médicaux:****Traitement en cours :**