Laboratoire du C.M.E.T.E
10 rue du Colonel Driant
75001 PARIS

Préconisations et renseignements cliniques Scotch test

Ref : 5.4-INS028 V01
Version : 01
Applicable le : 15-01-2016

Intérêt :

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

Préconisations pour le prélèvement :

A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles.

- Décoller le scotch de son support.
- Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Replacer les 2 lames dans l'étui.
- Identifier l'étui avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.

L'étui est acheminé au laboratoire dans les 4 heures suivant le prélèvement. A défaut, le prélèvement peut être conservé à température ambiante 48heures avant analyse.

Nom : Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance

Etiquette patient

Conditions de recueil :

☐ Prélèvement réalisé au Laboratoire ☐ Prélèvement apporté au laboratoire

Date du prélèvement :

Heure du prélèvement :

Remis au laboratoire
à :……..heures

Symptômes cliniques :

☐ Diarrhées ☐ Douleurs Abdominales

☐ Démangeaisons anales ☐ Insomnies

☐ Autre :

Contexte :

☐ Antécédents d'Oxyures

☐ Séjour à l'étranger dans les dernières semaines

Pays visité :

☐ Cas isolé ☐ Cas similaires dans l'entourage

☐ Familial

☐ Ecole

☐ Traitement en cours Lequel :